

نشرة المنتج

فول الصويا كامل الدهن المحمّص

FULL-FAT TOASTED SOYBEANS

مصدر يجمع بين بروتين الصويا والزيت الطبيعي لأعلاف الدواجن وغيرها من الأعلاف المناسبة. يحتوي على 362 غراماً كغ من البروتين الخام و195 غراماً كغ من الدهون الخام.



الخصائص الغذائية

- يجمع بين بروتين الصويا والزيت الموجود طبيعياً في الحبوب.
- قيم محددة للأحماض الأمينية القابلة للهضم لدى الدواجن.
- يحتوي على 102 غراماً كغ من حمض اللينوليك.
- يمكن تقييمه بديلاً للجمع بين كسب الصويا والزيت النباتي المضاف.
- تستهدف المعالجة بالتحميص تقليل العوامل المضادة للتغذية الحساسة للحرارة.

التطبيقات ومعدلات الإدراج الإرشادية

الدواجن

5–20%

الخنائير الصغيرة

7–15%

إناث الخنائير للتكاثر

10–15%

هذه المعدلات إرشادية. تُحدّد النسبة النهائية وفقاً لنوع الحيوان وعمره وتركيبه العلف الكاملة.

مرونة تركيب الأعلاف

يمكن مقارنة مساهمة البروتين والزيت في المنتج بمساهمة كسب فول الصويا والزيت النباتي المضافين بصورة منفصلة. وتعتمد الجدوى الاقتصادية على أسعار المواد الخام وتركيبه العلف. المنتج محمّص وليس مبثوقاً.

التخزين

الرطوبة: 11%. يُخزّن في مكان جاف ويُحمى من الرطوبة. تشير المواصفات إلى صلاحية تمتد لعدة أشهر في ظروف التخزين الجاف، ويُرجع إلى وثائق الدفعة لتأكيد المدة.

المواصفات الغذائية

القيم المتوسطة لكل كيلوغرام من المنتج بحالته عند التوريد

التركيب الغذائي	
المادة الجافة	890 g
البروتين الخام	362 g
الدهون الخام	195 g
الألياف الخام	64 g
الرماد الخام	46 g
النشا	60 g
السكريات	75 g
حمض اللينوليك	102 g

الأحماض الأمينية الكلية	
الليسين	22.8 g
الميثيونين	5.1 g
الميثيونين + السيستين	10.6 g
الثريونين	14.3 g
الترتوفان	4.8 g

المعادن	
الكالسيوم	2.0 g
الفوسفور	5.2 g
الصوديوم	0.1 g
البوتاسيوم	17.3 g
المغنيسيوم	3.2 g
الكلور	0.3 g

الأحماض الأمينية المهضومة للدواجن	
الليسين	19.3 g
الميثيونين	4.3 g
السيستين	4.4 g
الثريونين	11.7 g
الترتوفان	4.1 g

الأحماض الأمينية للخنزير	
الليسين	18.9 g
الميثيونين	4.2 g
الميثيونين + السيستين	8.3 g
الثريونين	11.2 g
الترتوفان	3.9 g

ملاحظة حول تركيب الأعلاف

القيم متوسطة غذائية، تُضبط التركيبة حسب متطلبات كل نوع من الحيوانات والمواصفات الفنية للمنتج. لم تُدرج قيمة طاقة غير موثقة.