

BOMILCH

حليب بودرة بادئ للحيوانات الصغيرة
تغذية لبنية مستساغة لصغار الحيوانات



نبذة عن المنتج

- مسحوق حليب عالي الجودة للخنائير الصغيرة والعجول
- محتوى مرتفع من اللاكتوز 459 غ/كغ لتوفير الطاقة
- استساغة عالية تساعد على تشجيع تناول العلف مبكراً
- قابلية ذوبان ممتازة لسهولة الاستخدام
- يساعد على دعم نمو الأمعاء والنمو خلال الأسابيع الأولى
- مزيج متوازن من العناصر الغذائية والمعادن
- مناسب للتغذية الأولية خلال الفطام والتربية

45.9%

اللاكتوز

25.5%

الدهون الخام

11.3%

البروتين الخام

التركيب الغذائي

متوسط القيم لكل كيلوغرام من المنتج

978 g	المادة الجافة
113 g	البروتين الخام
255 g	الدهون الخام بالتحلل المائي الحمضي
31 g	الرماد الخام
459 g	السكريات
5.1 g	الكالسيوم
3.0 g	الفوسفور
2.0 g	الصوديوم
7.6 g	البوتاسيوم
5.1 g	الكلوريد
0.5 g	المغنيسيوم

المواصفات الفنية الغذائية

الأحماض الأمينية والهضم لدى الخنازير

8.8 g	الليسين
3.1 g	الميثيونين
4.0 g	الميثيونين + السيستين
5.0 g	الثريونين
1.5 g	التربتوفان
8.5 g	الليسين المهضوم لفائضاً بصورة قياسية - خنازير
3.0 g	الميثيونين المهضوم لفائضاً بصورة قياسية - خنازير
3.8 g	الميثيونين + السيستين المهضومان - خنازير
4.6 g	الثريونين المهضوم لفائضاً بصورة قياسية - خنازير
1.3 g	التربتوفان المهضوم لفائضاً بصورة قياسية - خنازير
6.4 g	الفالين المهضوم لفائضاً بصورة قياسية - خنازير

الطاقة وتقييم القيمة الغذائية

191	قيمة الطاقة للخنازير	-9 g	FEB
2.8 g	الفوسفور القابل للهضم - خنازير	459 g	SUSAZ
1748	VEM	-25 g	PSW
2027	VEVI	550 g	SFKH
76 g	DVE	550 g	WFKH
-2 g	OEB	113 g	SFRE
0.26	VW	113 g	WFRE
74 g	WDVE		

التركيب وطريقة الاستخدام

التركيب المعلن: مسحوق حليب.

إرشادات التغذية: حسب احتياجات الحيوانات.

التخزين: لعدة أشهر في ظروف تخزين جافة.

إخلاء المسؤولية

جميع القيم الغذائية المذكورة متوسطة استرشادية لكل كيلوغرام من المنتج وقد تختلف بين الدفعات. استناداً إلى المواصفة الأصلية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، الإصدار 1. هذه الوثيقة ليست شهادة تحليل خاصة بدفعة إنتاج محددة.